

ДетраКлін® Гель

ДетраКлін® Гель

- Миттєве охолодження, яке полегшує анальний дискомфорт (подрознення, свербіж, печіння, підвищену чутливість)
- Попередження анального дискомфорту
- Попередження розвитку геморою та тріщин
- Сприяє процесу природного загоювання
- Гігієнічність та зручність застосування

Перед початком застосування ДетраКлін® Гелю, будь ласка, уважно прочитайте всю Інструкцію для застосування. Не викидайте цю Інструкцію для застосування. Якщо у Вас виникли будь-які запитання або якщо Ви маєте будь-які сумніви, будь ласка, зверніться до свого лікаря або фармацевта.

Зміст цієї Інструкції:

1. Для чого застосовується ДетраКлін® Гель?
2. Що містить ДетраКлін® Гель?
3. Які властивості мають інгредієнти цього продукту?
4. Що слід знати перед застосуванням ДетраКлін® Гелю?
5. Коли та як слід застосовувати ДетраКлін® Гель?
6. Зберігання
7. Вміст упаковки
8. Контактні дані

1. Для чого застосовується ДетраКлін® Гель?

ДетраКлін® Гель застосовується для полегшення та попередження анального дискомфорту, в тому числі симптомів геморою: подразнення, свербіжу, печіння і підвищеної чутливості.

Геморої та інші види анального дискомфорту часто зустрічаються під час вагітності та після пологів.

2. Що містить ДетраКлін® Гель?

ДетраКлін® Гель містить 37 г гелю, який не містить токсичних речовин та виготовлений на основі інгредієнтів природного походження. ДетраКлін® Гель містить запатентований 2QR-комплекс, який отримують з рослини алое Барбадоське, та інші інгредієнти, які забезпечують змащування та заспокоєння. Цей продукт не містить парфумованих віддушок та інгредієнтів тваринного походження.

3. Які властивості мають інгредієнти цього продукту?

ДетраКлін® Гель ефективний у полегшенні та попередженні анального дискомфорту, такого як свербіж, подразнення, печіння та підвищена чутливість. ДетраКлін® Гель сприяє швидкому полегшенню при геморої, тріщинах та анальному дискомфорту. ДетраКлін® Гель забезпечує миттєве полегшення за рахунок охолодження при застосуванні, а також змащення для полегшення акту випорожнення.

ДетраКлін® Гель формує фізичний бар'єр, який запобігає доступу бактерій до тканини організму. ДетраКлін® Гель сприяє процесу природного загоєння при геморої.

Склад:

Вода, гель алое Барбадоського, кросполімер галактоарабінану поліглюкуронової кислоти*, ПЕГ-8, ксантанова камедь, бетаїн, лаурет-9, феноксіетанол, етилгексилгліцерин, натрію гідроксид, калію фосфат.

* 2QR-комплекс / Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate. * 2QR



4. Що слід знати перед застосуванням ДетраКлін® Гелю?

ДетраКлін® Гель не містить токсичних хімічних речовин. При застосуванні ДетраКлін® Гелю не повідомлялось про будь-які небажані ефекти.

Будь ласка, спершу проконсультуйтеся з лікарем якщо: протягом тривалого часу Вас непокоїть гемороїдальна хвороба або спостерігається надмірна кровотеча.

Застосування інших препаратів: про взаємодію з іншими препаратами не повідомлялось.

5. Коли та як слід застосовувати ДетраКлін® Гель?

Для полегшення анального дискомфорту (подразнення, свербіж, печіння, підвищеної чутливості): наносити всередину та навколо ураженої ділянки принаймні двічі на добу у достатній кількості протягом двох тижнів або коли необхідно полегшити стан. Більш часте застосування покращує ефект.

Для попередження (внутрішнього та зовнішнього) геморою і тріщин: наносити всередину та навколо анального отвору до та після кожного акту випорожнення. Нанесіть невелику кількість гелю на палець або використайте аплікатор. Нанесіть всередину та навколо анального каналу, коли необхідно полегшити стан. Щільно закрийте кришку туби після застосування для запобігання висихання гелю.

Тривалість використання ДетраКлін® Гелю не повинна перевищувати 30 днів протягом одного періоду застосування.

Не слід застосовувати цей продукт у разі підвищеної чутливості до одного або декількох його інгредієнтів.

6. Зберігання

ДетраКлін® Гель слід застосовувати при кімнатній температурі. Зберігати тубу щільно закритою кришкою при температурі від 5 до 25 °C в захищеному від прямих сонячних променів місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовуйте цей продукт після закінчення терміну його придатності, вказаного у верхній частині туби та на упаковці.

7. Вміст упаковки

- Туба, що містить 37 г ДетраКлін® Гелю
- Інструкція для застосування
- Аплікатор

Виробник/Manufacturer:
ЮМедікал Б.В. (комерційна назва – Трімб Хелскеа)
201 Барбара Штросзілаан
1083HN Амстердам
Нідерланди

YouMedical B.V. (also trading as Trimb Healthcare)
Barbara Strozziilaan 201
1083HN Amsterdam
The Netherlands

Уповноважений представник в Україні:



ТОВ «Серв'є Україна»
вул. Набережно-Хрещатицька, 41
04070, м. Київ, Україна
тел.: +38 (044) 490 34 41
факс: +38 (044) 490 34 40

Всі запити стосовно цього продукту слід надсилати Уповноваженому представнику в Україні. Для подальшої інформації щодо ДетраКлін® Гель, будь ласка, відвідайте www.detraclin-ua.com

Дата останнього перегляду. 2021.10.22,
версія № 5.

Умовні позначення, що застосовуються на упаковці	
	Увага, дивись Інструкцію для застосування
	Ознайомтесь з Інструкцією для застосування
	Виробник
	Дата закінчення терміну придатності
	Номер партії
	Температура зберігання
	Символ відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів
	Символ біологічно активного інгредієнту 2QR-комплексу

