

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА — ГОСТРИЙ МІЄЛОЇДНИЙ ЛЕЙКОЗ

Тібсово, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг
івосиденіб

Інформація для пацієнта, який проходить лікування гострого мієлоїдного лейкозу

Ця Пам'ятка для пацієнта містить важливу інформацію про Тібсово для Вас і для працівників сфери охорони здоров'я.

- Постійно носіть цю пам'ятку з собою.
- Повідомте лікарю, фармацевту або медсестрі про те, що ви приймаєте препарат Тібсово.
- Якщо у Вас з'явився будь-який з перерахованих нижче симптомів, негайно зверніться до працівника сфери охорони здоров'я та покажіть йому Пам'ятку для пацієнта.
- Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію цієї пам'ятки. Остання версія Пам'ятки – це та, яка знаходилась в упаковці Тібсово, яку Ви в останнє використовували.

Про лікування

- Препарат Тібсово застосовується для лікування дорослих пацієнтів з гострим мієлоїдним лейкозом (ГМЛ) і призначається у комбінації з азацитидином (іншим протираковим препаратом). Тібсово призначається лише пацієнтам, у яких ГМЛ спричинений зміною (мутацією) білка ІДГ1.
- Препарат Тібсово може викликати **серйозні побічні реакції**, включаючи серйозний стан, відомий як **диференціувальний синдром**.
- Якщо не проводити лікування диференціувального синдрому, він може бути небезпечним для життя.
- Диференціувальний синдром у пацієнтів з ГМЛ виникав у період до 46 днів після початку лікування.

Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас виникне будь-який з таких симптомів диференціувального синдрому:

- лихоманка
- кашель
- труднощі з диханням
- висип
- зниження виділення сечі
- запаморочення або переднепритомний стан
- швидке збільшення маси тіла
- набряк рук або ніг

Детальна інформація міститься в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Тібсово.

Інформація для працівників сфери охорони здоров'я

- У пацієнтів, які отримували препарат Тібсово, виникав диференціувальний синдром, який за відсутності лікування може бути небезпечним для життя або призвести до летального наслідку.
- Диференціувальний синдром у пацієнтів з ГМЛ виникав у період до 46 днів після початку лікування.
- Диференціувальний синдром пов'язаний зі швидкою проліферацією та диференціуванням мієлоїдних клітин.

Симптоми включають:

неінфекційний лейкоцитоз, периферичний набряк, пірексію, задишку, плевральний випіт, артеріальну гіпотензію, гіпоксію, набряк легень, пневмоніт, перикардіальний випіт, висипання, гіперволемію, синдром лізису пухлини та підвищення рівня креатиніну.

- Якщо виникає підозра на розвиток диференціувального синдрому, слід розпочати лікування системними кортикостероїдами та проводити моніторинг гемодинамічних показників до зникнення симптомів та ще протягом мінімум 3 днів.

Детальна інформація стосовно препарату Тібсово міститься в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Заповніть цей розділ

Ім'я пацієнта: _____

Дата народження: _____

Дата початку застосування препарату Тібсово та доза: _____

Лікар, який призначив препарат / контактна особа для надання екстреної медичної допомоги: _____